P.O.M.I

Prescription Opioïd Misuse Index

Echelle permettant le dépistage du mésusage des antalgiques opioïdes.

ANTALGIQU(S) OPIOÏDE(S) CONCERNE(S) PAR CES QUESTIONS : Codéine, tramadol, poudre d'opium, morphine, oxycodone, fentanyl, hydromorphone	**Oui**	**Non**
Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur en QUANTITE PLUS IMPORTANTE, c'est-à-dire une quantité plus élevée que celle qui vous a été prescrite ?	☐	☐
Avez-vous déjà pris ce/ces médicaments anti-douleur PLUS SOUVENT SUE PRESCRIT(S) sur votre ordonnance, c'est-à-dire réduit le délai entre deux prises ?	☐	☐
Avez-vous déjà eu besoin de faire RENOUVELER VOTRE ORDONNANCE de ce/ces médicament(s) anti-douleur PLUS TÖT QUE PREVU ?	☐	☐
Avez-vous déjà eu la SENSATION DE PLANER OU RESSENTI UN EFFET STIMULANT après avoir pris ce/ces médicament(s) anti-douleur ?	☐	☐
Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur parce que vous étiez contrarié(e), c'est-à-dire pour SOULAGER OU SUPPORTER DES PROBLEMES AUTRES QUE LA DOULEUR ?	☐	☐
Avez-vous déjà CONSULTE PLUSIEURS MEDECINS, y compris aux urgences pour obtenir plus de ce/ces médicament(s) anti-douleur ?	☐	☐
Score :		

P.O.M.I

Prescription Opioïd Misuse Index

Pour quels patients ?

Adultes.

Pour quelles douleurs ?

Douleur justifiant de l'administration d'un opioïde.

Interprétation

≥ 2,
possible usage à risque du traitement opioïde.

Comment l'utiliser ?

Le soignant interroge le patient ou le patient répond de manière autonome aux 6 questions par « oui » ou « non ». Chaque réponse « oui » compte 1 point. La somme des réponses « oui » constitue le score. Si le score est ≥ 2, il est possible que le sujet présente un usage à risque du traitement par opioïde.

Recommandations de l'INTERCLUD OCCITANIE

Si le test est réalisé en autonomie, un score ≥ 2 doit inciter à en parler avec son médecin ou son pharmacien.
Rappel : Tout score doit être noté dans le dossier patient (IQSS).

1.-Knisely JS et coll. 2008. Prescription Opioid Misuse Index: A Brief Questionnaire to Assess Misuse. Journal of Substance Abuse Treatment 35 (4): 380-386.