



# Questionnaire d'observance de MORISKY

(En 8 questions)

*Auto-questionnaire permettant de mesurer l'adhésion à un traitement.*

<b>1</b>	Vous arrive-t-i parfois de prendre vos comprimés contre... (nom de la condition)	<b>Non = 1</b>
<b>2</b>	Parfois certaines personnes ne prennent pas leurs médicaments pour d'autres raisons qu'un oubli. En pensant aux deux dernières semaines, y a-t-il eu des jours où vous n'avez pas pris vos médicaments contre... (nom de la condition)	<b>Non = 1</b>
<b>3</b>	Vous est-il déjà arrivé de réduire la dose ou de prendre vos médicaments contre... (nom de la condition) sans en informer le médecin, parce que vous vous sentiez moins bien en les prenant ?	<b>Non = 1</b>
<b>4</b>	Lorsque vous voyagez ou que vous quittez la maison, vous arrive-t-il d'oublier d'emporter vos médicaments contre... (nom de la condition) ?	<b>Non = 1</b>
<b>5</b>	Avez-vous pris vos médicaments contre... (nom de la condition) ?	<b>Oui = 1</b>
<b>6</b>	Quand vous ressentez beaucoup moins, voire plus du tout vos symptômes, vous arrive-t-il parfois d'arrêter de prendre vos médicaments ?	<b>Non = 1</b>
<b>7</b>	Le fait de devoir prendre des médicaments contre... (nom de la condition) tous les jours représente un réel inconvénient pour certaines personnes. Vous arrive-t-il parfois d'être contrarié(e) par le fait d'avoir à respecter un traitement contre... (nom de la condition) ?	<b>Non = 1</b>
<b>8</b>	Vous arrive-t-il d'avoir des difficultés à vous rappeler de prendre tous vos médicaments contre... (nom de la condition) ? Choix de réponse et score pour la question 8 Jamais/Rarement = 1	<b>Jamais/rarement = 1</b> <b>De temps en temps = 0,75</b> <b>Parfois = 0,5</b> <b>Régulièrement = 0,25</b> <b>Tout le temps = 0</b>
<b>SCORE</b>		

1. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. *Med Care* 1986;24:67-74.  
2. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward HJ. Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. *Journal of clinical hypertension* 2008;10:348-54



# Questionnaire d'observance de MORISKY (en 8 questions)

## Pour quels patients ?

Adultes.

## Pour quelle utilisation ?

Mesure de l'adhésion à un traitement.

## Interprétation

≥ 8 : bonne adhésion  
6 à 7 : adhésion moyenne  
< 6 : faible adhésion

## Comment l'utiliser ?

Le soignant interroge le patient ou le patient répond de manière autonome aux 8 questions. Chaque réponse a une valeur définie. L'addition des points obtenus à chaque questions permet d'obtenir un score compris entre 0 et 8.

## Recommandations de l'INTERCLUD OCCITANIE

Ce score utile pour mesurer l'observance aux traitements antalgiques peut également être utilisé pour tous types de médicaments lorsqu'ils sont pris au long cours.

**Rappel : Tout score doit être noté dans le dossier patient (IQSS).**

1. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. *Med Care* 1986;24:67-74.

2. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward HJ. Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. *Journal of clinical hypertension* 2008;10:348-54