



ALGOPLUS

Echelle d'hétéro-évaluation comportementale permettant d'apprécier la douleur chez le sujet âgé présentant des troubles de la communication verbale.



Evaluation de la douleur

Echelle d'évaluation comportementale de la **douleur aiguë** chez la personne âgée présentant des troubles de la communication verbale

Identification du patient

Date de l'évaluation de la douleur	___/___/___		___/___/___		___/___/___		___/___/___		___/___/___		___/___/___	
Heure	___h___		___h___		___h___		___h___		___h___		___h___	
	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
1 - Visage												
Francement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires serrées, visage figé.												
2 - Regard												
Regard indifférent, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés.												
3 - Plaintes												
« Aie », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris.												
4 - Corps												
Retrait ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées.												
5 - Comportements												
Agitation ou agressivité, agrippement.												
Total OUI	■ /5		■ /5		■ /5		■ /5		■ /5		■ /5	
Professionnel de santé ayant réalisé l'évaluation	<input type="checkbox"/> Médecin <input type="checkbox"/> IDE <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> Autre <small>Paraphe</small>	<input type="checkbox"/> Médecin <input type="checkbox"/> IDE <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> Autre <small>Paraphe</small>	<input type="checkbox"/> Médecin <input type="checkbox"/> IDE <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> Autre <small>Paraphe</small>	<input type="checkbox"/> Médecin <input type="checkbox"/> IDE <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> Autre <small>Paraphe</small>	<input type="checkbox"/> Médecin <input type="checkbox"/> IDE <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> Autre <small>Paraphe</small>	<input type="checkbox"/> Médecin <input type="checkbox"/> IDE <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> Autre <small>Paraphe</small>						

COPYRIGHT

*Sensibilité 87%, spécificité 80%

1. RAT P, JOUVE E, PICKERING G, DONNAREL L, NGUYEN L, MICHEL M, CAPRIZ-RIBIERE F, LEFEBVRE-CHAPIRO S, GAUQUELIN F, BONIN-GUILLAUME S. Validation of an acute pain-behavior scale for older persons with inability to communicate verbally: Algoplus. Eur J Pain . 2010 Jul 16.
 2. RAT P. et coll. - Présentation de l'échelle de la douleur aiguë pour personnes âgées : ALGOPLUS Douleurs - Volume 8, numéro S1 ; pages 45-46 ; octobre 2007.
 3. RAT P. et coll - Développement d'une échelle comportementale d'évaluation de la douleur aiguë du sujet âgé : Algoplus La Revue Canadienne du Vieillessement. 2006-Vol 25, ; Supl.1 :141.



ALGOPLUS

Pour quels patients ?

Patient âgé pour tous les cas où l'auto-évaluation n'est pas praticable.

Pour quelles douleurs ?

- Pathologies douloureuses aiguës
- Accès douloureux transitoires
- Douleurs procédurales

Seuil de prescription antalgique

Un score $\geq 2/5$ permet de diagnostiquer la présence d'une douleur et nécessite la mise en place d'une thérapie antalgique adaptée.

Comment l'utiliser ?

L'échelle comporte cinq items (domaines d'observation). La présence d'un seul comportement dans chacun des items suffit pour coter « oui » l'item considéré. Chaque item coté « Oui » est compté 1 point, ce qui permet d'obtenir un score sur 5. La simple observation d'un comportement doit impliquer sa cotation quelles que soient les interprétations étiologiques éventuelles de sa pré existence.

En pratique, pour remplir la grille, observer dans l'ordre : les expressions du visage, celles du regard, les plaintes émises, les attitudes corporelles et enfin le comportement général. Chaque item coté « oui » vaut un point et la somme des items permet d'obtenir un score total sur cinq.

Recommandations de l'INTERCLUD OCCITANIE

Pour l'item « comportements », l'agrippement doit être coté « oui » quel que soit le support d'agrippement (patient lui-même, soignant ou tout autre support).

Attention, La cotation d'un item peut être effectuée en fonction d'une interprétation étiologique du signe et non par sa simple présence, comme par exemple, l'item « plaintes » coté « non » parce que le cri du patient est attribué à la démence ou parce que le patient crie depuis longtemps, ou encore, l'item « comportements » coté « non » parce que l'agrippement à la barrière de protection est attribué à la peur de tomber.

Rappel : Tout score doit être noté dans le dossier patient (IQSS).

1. RAT P, JOUVE E, PICKERING G, DONNAREL L, NGUYEN L, MICHEL M, CAPRIZ-RIBIERE F, LEFEBVRE-CHAPIRO S, GAUQUELIN F, BONIN-GUILLAUME S. Validation of an acute pain-behavior scale for older persons with inability to communicate verbally: Algoplus. Eur J Pain . 2010 Jul 16.

2. RAT P. et coll. - Présentation de l'échelle de la douleur aiguë pour personnes âgées : ALGOPLUS Douleurs - Volume 8, numéro S1 ; pages 45-46 ; octobre 2007.

3. RAT P. et coll - Développement d'une échelle comportementale d'évaluation de la douleur aiguë du sujet âgé : Algoplus La Revue Canadienne du Vieillessement. 2006-Vol 25, ; Supl.1 :141.