ECHELLE DES VISAGES

Faces Pain Scale - Revised

Outil d'auto-évaluation.

Cotation de l'intensité de la douleur et de son soulagement par sélection d'un faciès parmi six.



0 2 4 6 8 10

Cotation de la douleur selon le faciès sélectionné

Réglettes disponibles

- **SPARADRAP : www.sparadrap.org**
- **FONDATION APICIL : www.fondation-apicil.org**

1. *1. HICKS CL, VON BAEYER CL, SPAFFORD P, VAN KORLAAR I, GODENOUGH B. (2001) The Faces Pain Scale - Revised : Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain ; 93 : 173-83.*
2. *2. BIERI D, REEVE R, CHAMPION GD, ADDICOAT L, ZIEGLER J.(1990) The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children : Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain ; 41 : 139-50*
3. *4. www.sfetd.org*
4. *5. www.pediadol.org*

ECHELLE DES VISAGES

Faces Pain Scale - Revised

Pour quels patients ?

Enfants à partir de 4 ans.

Pour quelles douleurs ?

Tout type de douleur.

Seuil de prescription antalgique

Un score ≥ 4 nécessite une thérapeutique antalgique adaptée.

Comment l'utiliser ?

Cette échelle a été validée avec une consigne précise qui doit être expliquée à l'enfant : "Ces visages montrent combien on peut avoir mal. Ce visage (montrer celui de gauche) montre quelqu'un qui n'a pas mal du tout. Ces visages (les montrer un à un de gauche à droite) montrent quelqu'un qui a de plus en plus mal, jusqu'à celui-ci (montrer celui de droite), qui montre quelqu'un qui a très très mal. Montre-moi le visage qui montre combien tu as mal en ce moment."
Une fois le visage repéré, le soignant prend en compte la cotation correspondante.

Recommandations de l'INTERCLUD OCCITANIE

Échelle facile à comprendre, souvent préférée toute l'enfance et même après 12 ans par les enfants fatigués et douloureux.
Certains enfants peuvent sous-estimer volontairement leur douleur (par peur de devoir rester à l'hôpital, des traitements, des piqures, de déplaire…). Il faudra alors bien expliquer la raison pour laquelle on évalue sa douleur.
Bien qu'ayant été conçue pour être utilisée en milieu pédiatrique, elle est apparue valide et fiable chez l'adulte et le sujet âgé. Elle peut être employée en cas de difficulté d'utilisation de l'EVA, de l'EN ou de l'EVS, par exemple chez le patient ayant des difficultés de verbalisation (aphasie, dysphonie, intubation…).
Rappel : Tout score doit être noté dans le dossier patient (IQSS).

1. *1. HICKS CL, VON BAEYER CL, SPAFFORD P, VAN KORLAAR I, GODENOUGH B. (2001) The Faces Pain Scale - Revised : Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain ; 93 : 173-83.*
2. *2. BIERI D, REEVE R, CHAMPION GD, ADDICOAT L, ZIEGLER J.(1990) The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children : Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain ; 41 : 139-50*
3. *4. www.sfetd.org*
4. *5. www.pediadol.org*